
WAS VERURSACHT DAS GBS?

Die Ursache ist nicht bekannt. Man weiß jedoch, dass etwa 50 % der Fälle nach mikrobiellen (Viren- oder Bakterien-) Infektionen auftreten, darunter so einfache und häufige Erkrankungen wie Grippe oder eine Lebensmittelvergiftung. Einige Theorien gehen von einer Autoimmunreaktion aus, bei der das aus Antikörpern und weißen Blutkörperchen bestehende Abwehrsystem des Patienten das körpereigene Myelin (die Umhüllung oder Isolierung von Nerven) angreift, was zu Taubheitsgefühlen und Schwäche führt.

WIE WIRD GBS DIAGNOSTIZIERT?

Oft kann die Diagnose bereits anhand der Symptome und der körperlichen Untersuchung eines Patienten gestellt werden. Häufig tritt eine schnell einsetzende (aufsteigende) Schwäche auf, die oft von anormalen, beide Körperseiten in ähnlicher Weise betreffenden Empfindungen begleitet wird.

Ebenfalls häufig ist der Verlust tiefer Sehnenreflexe, wie z. B. des Patellarsehnenreflexes. Zur Bestätigung der Diagnose können eine Lumbalpunktion zum Nachweis eines erhöhten Proteinwerts im Liquor oder elektrische Tests der Nerven- und Muskelfunktion durchgeführt werden.

LASSEN SIE SICH IN DAS **GBS|CIDP PATIENTENREGISTER** AUFNEHMEN, TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN MIT UND LEISTEN SIE EINEN WICHTIGEN BEITRAG ZU EINER BESSEREN ZUKUNFT FÜR PATIENTEN WELTWEIT ...
[HTTPS://GBS-CIDPIAMRARE.ORG/](https://GBS-CIDPIAMRARE.ORG/)

GBS kann bei Personen jeden Alters, Geschlechts oder ethnischen Hintergrunds auftreten. Sie ist gekennzeichnet durch das schnelle Einsetzen von Schwäche sowie häufig eine Lähmung der Beine und Arme, der Atemmuskulatur und des Gesichts.

WIE WIRD GBS BEHANDELT?

Das GBS ist in seinen frühen Stadien unvorhersehbar, weshalb die meisten neu diagnostizierten Patienten, abgesehen von sehr leichten Fällen, in ein Krankenhaus eingewiesen werden. In der Regel wird ein neuer Fall von GBS auf der Intensivstation aufgenommen, um die Atmung und andere Körperfunktionen zu überwachen, bis sich die Krankheit stabilisiert hat. Plasmapherese (ein Blutreinigungsverfahren) und hochdosierte intravenöse Immunglobuline sind oft hilfreich, um den Verlauf des GBS abzukürzen. Die Länge der akuten Phase des GBS variiert typischerweise zwischen einigen Tagen und einigen Monaten, und 90 % der Patienten treten innerhalb von vier Wochen in die rehabilitative Phase ein. Die Patientenversorgung umfasst koordinierte Maßnahmen eines Teams, das beispielsweise aus einem Neurologen, Physiotherapeuten (Arzt für Rehabilitation), Internisten, Allgemeinmediziner, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter, einer Pflegekraft und einem Psychologen oder Psychiater besteht. Einige Patienten benötigen eine spezielle Therapie, wenn die Sprachmuskeln betroffen sind.

GBS|CIDP FOUNDATION INTERNATIONAL

Die Organisation wurde 1980 von Estelle und Robert Benson gegründet, um anderen zu helfen, mit dieser beängstigenden und möglicherweise katastrophalen Erkrankung umzugehen, von der sich die Patienten nicht immer vollständig erholen. Die Foundation besteht aus über 182 Gruppen in Nordamerika, Europa, dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika, Australien, Neuseeland und den Niederlanden.

Ihr Ziel ist es, GBS-Patienten und ihre Familien zu unterstützen. Die GBS|CIDP Foundation International ist stolz darauf, dass einige der weltweit führenden Experten für das GBS sowie einige Ärzte, die selbst an diesem Syndrom erkrankt waren, Mitglieder ihres medizinischen Beirats sind.

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Wenn Sie GBS haben oder jemanden mit dieser Erkrankung kennen und Hilfe oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die GBS|CIDP Foundation International. Wenn Sie eine örtliche Unterstützerguppe gründen oder Informationen zu Ärzten vor Ort erhalten möchten, die Erfahrung mit GBS haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wenn Sie Arzt sind und unsere Literatursammlung oder emotionale Unterstützung für Ihre Patienten erhalten möchten, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir sind für Sie da.

VERFÜGBARE DIENSTE

- Exzellenzzentren
- Patientenbesuche durch genesene Personen
- Umfassende Informationsbroschüren über alle Stadien von GBS|CIDP
- Hilfe für Patienten durch lokale oder weltweit tätige Gruppen
- Social Media-Kanäle zur Vernetzung
- Überweisung an Ärzte, die Erfahrung mit GBS haben
- Vierteljährliche Newsletter
- Forschungsförderung
- Patientenvertretung und Mitwirkungsmöglichkeiten
- Internationale Informationssymposien für die medizinische Fachwelt und die breite Öffentlichkeit
- Online-Ressourcen. Besuchen Sie unsere Website: www.gbs-cidp.org

INTERESSENVERTRETUNG UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG
UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG INTERESSENVERTRETUNG
AUFKLÄRUNG FORSCHUNG INTERESSENVERTRETUNG UNTERSTÜTZUNG
INTERESSENVERTRETUNG UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG
UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG INTERESSENVERTRETUNG
AUFKLÄRUNG FORSCHUNG INTERESSENVERTRETUNG UNTERSTÜTZUNG
INTERESSENVERTRETUNG UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG
UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG INTERESSENVERTRETUNG
AUFKLÄRUNG FORSCHUNG INTERESSENVERTRETUNG UNTERSTÜTZUNG
INTERESSENVERTRETUNG UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG
UNTERSTÜTZUNG AUFKLÄRUNG FORSCHUNG INTERESSENVERTRETUNG