



## CARE SUNT CAUZELE SGB?

Cauza este necunoscută. Știm că aproximativ 50% din cazuri survin la scurt timp după o infecție microbiană (virală sau bacteriană), uneori o infecție simplă și obișnuită, cum este gripa sau toxiiinfecția alimentară. Unele teorii sugerează un factor declanșator autoimun în care sistemul de apărare al pacientului, format din anticorpi și globule albe, este solicitat să acționeze împotriva organismului, deteriorând mielina (învelișul sau izolația nervilor), ceea ce duce la amorțeală și slăbiciune.

## CUM SE DIAGNOSTICHEAZĂ SGB?

Adesea, simptomele pacientului și examenul fizic al acestuia sunt suficiente pentru a indica diagnosticul. Instalarea rapidă a slăbiciunii (ascendente), însoțită în mod frecvent de senzații anormale care afectează ambele părți ale corpului în mod similar, este frecventă.

Se constată adesea pierderea reflexelor osteotendinoase, cum ar fi reflexul genunchiului. Pentru confirmarea diagnosticului se pot efectua puncții lombare pentru depistarea nivelurilor crescute ale proteinelor în lichid și teste electrice ale funcționării nervilor și mușchilor.

## CUM SE TRATEAZĂ SGB?

În stadiile sale incipiente, SGB este imprevizibil; prin urmare, cu excepția cazurilor foarte ușoare, majoritatea pacienților nou diagnosticați sunt spitalizați. De regulă, un caz nou de SGB se internează în secția ATI (terapie intensivă) pentru monitorizarea respirației și a altor funcții ale organismului până când boala se stabilizează. Schimbul de plasmă (o

procedură de „curățare” a sângelui) și administrarea intravenoasă a imunoglobulinelor în doză mare sunt utile adesea pentru reducerea duratei SGB. În ceea ce privește durata, faza acută a SGB variază de regulă de la câteva zile la câteva luni, peste 90% dintre pacienți trecând în faza de recuperare în decurs de patru săptămâni. Asistența pacienților presupune eforturi coordonate ale unei echipe alcătuite dintr-un medic neurolog, un medic de medicină fizică (medic de recuperare), un medic internist, un medic de familie, un fizioterapeut, un terapeut ocupațional, un asistent social, o asistentă medicală și un psiholog sau medic psihiatru. Unii pacienți au nevoie de logopedie în cazul în care au fost afectați mușchii vorbirii.

## GBS|CIDP FOUNDATION INTERNATIONAL

Organizația a fost înființată în anul 1980 de către Estelle și Robert Benson pentru a ajuta alte persoane să facă față acestei tulburări înfricoșătoare și posibil catastrofale în urma căreia este posibil ca recuperarea să nu fie întotdeauna completă. Fundația are peste 182 filiale în America de Nord, Europa, Orientul Apropiat și Mijlociu, Africa, Australia, Noua Zeelandă și Olanda.

Obiectivele sale sunt de a vă oferi susținere dvs., pacientul cu SGB, și familiei dvs. Fundația se mândrește cu faptul că din consiliul său medical consultativ fac parte unii dintre experții de prim rang în SGB pe plan mondial, precum și medici care au suferit ei înșiși de această tulburare.

**ALĂTURAȚI-VĂ REGISTRULUI DE PACIENȚI CU GBS|CIDP, ÎMPĂRTĂȘIȚI-VĂ EXPERIENȚA ȘI JUCAȚI UN ROL DE IMPORTANȚĂ CRITICĂ ÎNTR-UN VIITOR MAI BUN PENTRU PACIENȚII DE PRETUTINDENI...**

[HTTPS://GBS-CIDP.IAMRARE.ORG/](https://GBS-CIDP.IAMRARE.ORG/)

## AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Dacă aveți SGB sau cunoașteți pe cineva care are și dorește asistență sau informații, contactați Fundația. Dacă doriți să înființați o filială locală a unui grup de susținere sau să găsiți pe plan local medici familiarizați cu SGB, contactați-ne. Dacă sunteți un profesionist din domeniul sănătății și doriți să consultați literatura noastră de specialitate sau căutați susținere emoțională pentru pacienții dvs., nu ezitați să ne contactați. Suntem aici ca să vă ajutăm.

## SERVICIILE DISPONIBILE

- Centre de excelență
- Vizite la pacienți efectuate de către persoane recuperate
- Broșuri cu informații cuprinzătoare pentru toate stadiile GBS|PDIC
- Asistență pentru pacienți din partea filialelor locale și pe plan global
- Canale media sociale pentru conectare
- Recomandări de medici cu experiență în SGB
- Buletine informative trimestriale
- Finanțare pentru cercetare
- Sensibilizare a opiniei publice pentru pacienți și modalități de implicare
- Simpozioane educaționale internaționale pentru comunitatea medicală și publicul larg
- Resurse online Vizitați site-ul nostru web: [www.gbs-cidp.org](http://www.gbs-cidp.org)

*SGB poate apărea la orice persoană, la orice vârstă, indiferent de sex sau de originea etnică. Se caracterizează prin instalare rapidă a slăbiciunii și adesea a paraliziei la nivelul picioarelor, brațelor, mușchilor respiratori și feței.*