

¿QUÉ CAUSA EL SGB?

La causa es desconocida. Sabemos que alrededor del 50% de los casos ocurren poco después de una infección (viral o bacteriana), algunas tan simples y comunes como la gripe o una intoxicación alimentaria. Algunas teorías sugieren un desencadenante autoinmunitario, donde los anticuerpos y glóbulos blancos del sistema de defensa del paciente se activan contra el propio cuerpo, dañando la mielina (cubierta o aislamiento del nervio) y causando entumecimiento y debilidad.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL SGB?

Muy a menudo, los síntomas y el examen físico de un paciente son suficientes para hacer el diagnóstico. Es común el inicio rápido de la debilidad (ascendente), frecuentemente acompañada de sensaciones anormales que afectan de manera similar a ambos lados del cuerpo.

Con frecuencia se observa una pérdida de reflejos tendinosos profundos, como el de la sacudida de la rodilla. Para confirmar el diagnóstico, se pueden hacer una punción lumbar para determinar si hay una concentración elevada de proteínas en el líquido y pruebas eléctricas de la función nerviosa y muscular.

ÚNASE AL **REGISTRO DE PACIENTES CON SGB/PDIC**, COMPARTA SU EXPERIENCIA Y DESEMPEÑE UNA FUNCIÓN IMPORTANTE EN LA CREACIÓN DE UN FUTURO MEJOR PARA PACIENTES DE TODO EL MUNDO... [HTTPS://GBS-CIDP.IAMRARE.ORG/](https://gbs-cidp.iamrare.org/)

El SGB puede surgir en cualquier persona, a cualquier edad, sin importar el género o sus antecedentes étnicos. Se caracteriza por la rápida aparición de debilidad y, a menudo, parálisis de las piernas, los brazos, los músculos respiratorios y la cara.

¿CÓMO SE TRATA EL SGB?

El SGB en sus primeras etapas es impredecible, así que, excepto en casos muy leves, la mayoría de los pacientes recién diagnosticados son hospitalizados. Normalmente, los casos nuevos de SGB se ingresan a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para vigilar la respiración y otras funciones corporales hasta que la enfermedad se estabilice. El intercambio de plasma (un procedimiento de "limpieza" de la sangre) y las altas dosis de inmunoglobulinas intravenosas suelen ayudar a acortar el curso del SGB. La fase aguda del SGB suele tener una duración variable que va de pocos días a meses, con más del 90% de los pacientes pasando a la fase de rehabilitación en cuatro semanas. La atención al paciente implica los esfuerzos coordinados de un equipo que puede estar formado por un neurólogo, un fisiatra (médico de rehabilitación), un internista, un médico de familia, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, una enfermera y un psicólogo o psiquiatra. Si se afectaron los músculos del habla, algunos pacientes requieren terapia del habla.

GBS|CIDP FOUNDATION INTERNATIONAL

La organización fue fundada en 1980 por Estelle y Robert Benson para ayudar a otras personas a hacer frente a este aterrador y potencialmente catastrófico trastorno que no siempre tiene una recuperación completa. La Fundación tiene más de 182 grupos en América del Norte, Europa, Cercano y Medio Oriente, África, Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos.

Sus objetivos son apoyar a los pacientes como usted que tienen SGB y a su familia. La Fundación se enorgullece de tener en su consejo asesor médico a algunos de los principales expertos mundiales en SGB, así como a médicos que han tenido el trastorno.

¿NECESITA AYUDA?

Si tiene SGB o conoce a alguien que lo tiene y quiere ayuda o información, comuníquese con la Fundación. Si desea formar un grupo de apoyo local o conocer a los médicos locales que están familiarizados con el SGB, contáctenos. Si usted es un profesional de la salud y desea consultar nuestra literatura o grupos de apoyo emocional para sus pacientes, no dude en contactarnos. Estamos a sus órdenes.

SERVICIOS DISPONIBLES

- Centros de excelencia
- Visitas de personas recuperadas a pacientes
- Folletos con información completa para todas las etapas del SGB o la PDIC
- Asistencia al paciente por parte de grupos locales y mundiales
- Canales de redes sociales para conectarse
- Recomendaciones de médicos con experiencia en SGB
- Boletines trimestrales
- Financiación para investigación
- Intercesión a favor de los pacientes y formas de involucrarse
- Simposios educativos internacionales para la comunidad médica y el público general
- Recursos en línea. Visite nuestro sitio web: www.gbs-cidp.org